
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to choroba typowa dla obszarów Europy centralnej, wschodniej i północnej Azji. W Polsce, w ostatnich latach, odnotowano ją niemal we wszystkich regionach.

FSME-IMMUN Inject

Szczepionka przeciw wczesnoletniemu kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu.

Szczepienie zalecane:

Osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu, w tym także turystom oraz uczestnikom obozów i kolonii.

SCHEMAT SZCZEPIENIA

Uodpornienie podstawowe	Dawka	Odstęp czasu między podaniami
1 dawka	0,5 ml j.m. domięśniowo	
2 dawka	0,5 ml j.m. domięśniowo	1-3 miesiące po 1 dawce
3 dawka	0,5 ml j.m. domięśniowo	9-12 miesięcy po 2 dawce
Dawka przypominająca	0,5 ml j.m. domięśniowo	3 lata od ostatniego szczepienia

Najkorzystniej podać dwie dawki w sezonie zimowym.

SCHEMAT PRZYŚPIESZONY

dla osób zgłaszających się do szczepienia wiosną lub latem

Uodpornienie podstawowe	Dawka	Odstęp czasu między podaniami
1 dawka	0,5 ml j.m. domięśniowo	
2 dawka (zabezpieczenie na rok)	0,5 ml j.m. domięśniowo	14 dni po 1 dawce
3 dawka (zabezpieczenie na 3 lata)	0,5 ml j.m. domięśniowo	9-12 miesięcy po 2 dawce

Ochrona przed zakażeniem po podaniu 3 dawek szczepionki utrzymuje się przez co najmniej 3 lata.

PRZECIWSKAZANIA

Infekcja gorączkowa.

Uczulenie na składniki szczepionki (białko jaja kurzego).

Ciąża.

Nie szczepić dzieci do ukończenia 12 miesiąca życia..

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu podania.

Może nastąpić powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.

Gorączka (szczególnie dzieci po pierwszej dawce), bóle głowy, nudności, wymioty, bóle mięśniowe (objawy przypominające zapalenie opon – samoistnie ustępują). Zaleca się podanie środków przeciw gorączkowych. Objawy zwykle ustępują po 24 godz.